

### Raccolta urine per l'esame urine completo

Utilizzare gli appositi contenitori monouso a bocca larga forniti dal Laboratorio o acquistabili in farmacia (non utilizzare altri contenitori, quali bottiglie, vasetti di vetro, etc.).

Raccogliere un campione delle prime urine del mattino, scartando il primo getto.

Perchè l'esame venga eseguito correttamente, è necessario raccogliere una quantità pari ad almeno 10 ml. Nella donna, prima della raccolta, eseguire il lavaggio dei genitali esterni; si consiglia di attendere la fine del ciclo mestruale. Consegnare il campione in Laboratorio entro le 9:30

**N.B. accertarsi di aver contrassegnato il contenitore con nome e cognome, e di averlo chiuso/avvitato correttamente.**

### Raccolta urine per urinocoltura

E' necessario utilizzare gli appositi contenitori sterili a bocca larga forniti dal laboratorio o acquistabili in farmacia (non utilizzare altri contenitori, quali bottiglie, vasetti di vetro, etc.).

Raccogliere un campione delle prime urine del mattino, secondo il seguente procedimento:

- 1) lavare accuratamente gli organi genitali;
- 2) scartare il primo getto di urina, per pulire l'ultimo tratto delle vie urinarie
- 3) raccogliere l'urina seguente, avendo cura di non toccare il recipiente internamente;

Consegnare il campione in Laboratorio nel più breve tempo possibile, (se ciò non fosse possibile, conservare il contenitore in frigorifero non più di 24 ore), e comunque **non più tardi delle 9:30.**

**Importante:** è necessario eseguire l'esame circa 6 - 8 giorni dopo la sospensione della terapia antibiotica, salvo diversa prescrizione medica (in tal caso, segnalarlo al Laboratorio).

**N.B. accertarsi di aver contrassegnato il contenitore con nome e cognome, e di averlo chiuso/avvitato correttamente.**

### Raccolta urine per esame citologico oncologico (pap-test o test di Papanicolau)

- Scartare la prima minzione del mattino, non idonea per il ristagno notturno.
- Raccogliere un campione della **seconda urina del mattino**, in un contenitore monouso a bocca larga fornito dal Laboratorio o acquistabile in Farmacia.
- L'esame deve essere eseguito per **tre giorni consecutivi, necessariamente lunedì, martedì e mercoledì**, e consegnato in laboratorio nel più breve tempo possibile, entro 2 ore dalla raccolta e **non più tardi delle 9:30.**

**N.B. accertarsi di aver contrassegnato il contenitore con nome e cognome, e di averlo chiuso/avvitato correttamente.**

### Raccolta urine per ricerca microscopica Bacilli Acido-Alcool Resistenti (BAAR)

Raccogliere tutta la prima urina del mattino all'interno di un contenitore sufficientemente capiente. Qualora l'esame fosse richiesto su tre campioni, la raccolta dovrà essere eseguita per **tre giorni consecutivi, necessariamente lunedì, martedì e mercoledì**, e consegnata in laboratorio nel più breve tempo possibile, **non più tardi delle 9:30.**